

Lignes directrices pour le transport de la volaille

Annexe C

Modèle de guide décisionnel en matière d'euthanasie

Vos réponses aux questions suivantes peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d'euthanasie de la volaille (adapté de 39,40) :

- l'oiseau semble-t-il avoir mal ou être en détresse (voir ci-dessous) ?
- quel est le degré de douleur ou de détresse et peuvent-elles être traitées ?
- quelle est la cause de la douleur ou de la détresse? Peut-on traiter la cause ?
- l'oiseau semble-t-il intéressé à manger et à boire ?
- l'oiseau peut-il accéder à la nourriture et à l'eau ?
- l'oiseau répond-il positivement au traitement ou est-ce que son état s'aggrave ?
- un rétablissement est-il probable dans un délai acceptable ?
- l'oiseau risque-t-il de transmettre une maladie à d'autres oiseaux ?

Chaque exploitation peut établir d'autres critères pour l'euthanasie.

La liste suivante donne des exemples de signes de douleur ou de détresse chez des oiseaux qui justifient une évaluation plus approfondie :

- faible, non alerte
- posture voûtée, tête rentrée, souvent les yeux fermés
- plumes ébouriffées ou sales sans rapport avec l'état de la litière
- incapable de se lever ou de marcher à cause d'une blessure ou d'une anomalie physique
- réticence à manger ou à boire
- gravement blessé
- tête enflée
- crête décolorée
- émaciation